

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

**FICHE D'INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS
« PATIENT »**

Dasatinib SPRYCEL®

Notes personnelles



Présentation et conditions de prescription

- Présentations disponibles : comprimés à 20, 50, 70 et 100 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- L'administration se fait en une ou deux prises par jour pendant ou en dehors des repas.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord de votre médecin.
- Ne pas écraser ou mâcher les comprimés.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de dasatinib, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant. Notez l'oubli sur le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets secondaires gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent.
- Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.
- Évitez le jus de pamplemousse et le millepertuis.



Gestion des principaux effets indésirables

| | PREVENTION | CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE |
|----------------------------------|---|--|
| Fréquents | | |
| Diarrhée | Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...). | Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour. |
| Nausées et vomissements | Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits | Contactez votre médecin si besoin |
| Rétention hydrique | Maintenir une alimentation à faible teneur en sel. | Surveiller le poids. Contactez votre médecin si prise de poids rapide et inattendue. |
| Diminution des plaquettes | Eviter les anti-inflammatoires et l'aspirine | Contactez rapidement le médecin si saignements inhabituels (ex : nez, gencive...). |
| Fièvre, frisson et toux | Limiter les contacts avec les personnes malades. Lavez vous les mains, désinfectez les plaies. | Contactez le médecin en cas de température > 38°C. |
| Eruption cutanée | Eviter l'exposition au soleil. Ecran total. | Contactez le médecin. |