

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

**FICHE D'INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS
« PATIENT »**

Nilotinib TASIGNA®

Notes personnelles



Type de produit, indications et conditions de prescription

- Boîte de 28 ou 112 gélules dosées à 200 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

L'administration se fait en deux prises de 400 mg par jour toutes les 12 heures et à distance des repas (ne pas consommer d'aliment dans les 2 heures précédents la prise, ni dans l'heure qui suit la prise).

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Laissez la gélule dans son emballage jusqu'au moment de la prise.
- Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Tasigna®, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Notez l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident dans le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



Alertes

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- Evitez le jus de pamplemousse et le millepertuis.

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

▸ Fréquents

Diarrhée / nausées / vomissements

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l'alcool.
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour.
Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

Rétention hydrique : œdème périphérique, œdème pulmonaire

Limiter la consommation de sel dans l'alimentation

Surveiller votre poids Si prise de poids rapide et inattendue : contactez votre médecin.

Neutropénie Fièvre, frisson

Eviter le contact avec des personnes malades.
Lavez-vous les mains, désinfecter les plaies.

Contactez le médecin référent en cas de température > 38°C

Eruption cutanée

Eviter l'exposition au soleil (écran total) et à la chaleur

Contactez le médecin si besoin.

▸ Peu fréquents

Perte des cheveux

Peu fréquente et réversible à l'arrêt du traitement