

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)

**FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MEDICAMENTS  
« PATIENT »**

**Lapatinib TYVERB®**

Notes personnelles



## Présentation et conditions de prescription

- Une présentation est disponible :
  - o Boîtes de 70 ou de 84 comprimés jaunes clairs dosés à 250 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

## Comment prendre ce médicament

- Le lapatinib se prend une fois par jour, avec un verre d'eau, 1 heure avant ou après un repas. Respectez au mieux l'intervalle de 24 h entre chaque prise. Le traitement se prend en continu. La posologie est :
  - o De 6 comprimés par jour si le lapatinib est associé à un « inhibiteur de l'aromatase » (FEMARA, ARIMIDEX, AROMASINE).
  - o De 5 comprimés par jour si le lapatinib est associé à la capécitabine XELODA.
- La vinorelbine se prend une fois par semaine, à jour fixe, après le repas, avec un verre d'eau. La capsule ne doit pas être mâchée ni sucée.

TYVERB : traitement de J1 à J31 de chaque mois (en continu)

Si association avec anti-aromatase : anti-aromatase prescrit en continu de J1 à J31

Si association avec XELODA : XELODA prescrit de J1 à J14.

Reprise du XELODA à J22

Arrêt du XELODA de J15 à J21 sans arrêt du TYVERB

## Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne pas écraser ou mâcher les comprimés.
- Laissez les comprimés dans leur emballage jusqu'au moment de la prise.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de TYVERB, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant. Notez l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident dans le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.

## Alerte

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- Évitez le jus de pamplemousse ou de millepertuis au cours de votre traitement par TYVERB.

## Gestion des principaux effets indésirables

### PREVENTION

### CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

#### Fréquents

**Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds. Eruption cutanée.**

Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains (jardinage, bricolage, bijoux serrés), porter des chaussures amples, utiliser un savon doux. Appliquer souvent une crème hydratante sur vos pieds et vos mains.

Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. En cas de douleurs ou si vos activités sont affectées, appelez votre médecin.

#### Diarrhée

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

#### Ulcération et infections de la bouche.

Maintenir une bonne hygiène buccale, utilisez une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas. Utilisez le bain de bouche prescrit par votre oncologue. Eviter les aliments acides, épicés et irritants.

Contactez votre médecin si besoin.

#### Difficulté à respirer, toux, palpitations cardiaques.

Repos et exercices modérés (marche). Ayez une bonne hygiène de vie.

Appeler votre médecin.

#### Fatigue ou faiblesse, anorexie, insomnie, céphalées, douleurs au niveau des extrémités, douleurs dorsales.

Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits

Prudence si vous devez conduire.

#### Nausées et vomissements, douleurs abdominales.

Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits

Contactez votre médecin si besoin