

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Imatinib GLIVEC®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- L'imatinib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosine kinase.
- Indications 2016 :
 - ✓ Certaines Leucémies myéloïdes chroniques (LMC) et leucémies aiguës lymphoïdes (LAL) chromosome Philadelphie positive (Ph+) y compris chez l'enfant.
 - ✓ Certains syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs (associés à des réarrangements du gène du PDGFR),
 - ✓ Certains syndromes hyperéosinophiliques (SHE) et leucémies chroniques à éosinophiles (LCE),
 - ✓ Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) malignes Kit (CD 117) positives,
 - ✓ Dermatofibrosarcome protuberans non résecable ou en rechute et/ou métastatique ne relevant pas d'un traitement chirurgical.
- Posologies usuelles :
 - ✓ Enfant : ▪ LMC : 340 à 570mg/m²/jour sans dépasser 800 mg/jour
 - LAL : 340 /m²/jour sans dépasser 600 mg/jour
 - ✓ Adulte : ▪ SHE et LCE : 100 à 400 mg en une prise par jour
 - Autres indications : 400 à 800 mg, administrés en 1 prise par jour pour des doses de 400 à 600 mg/j et en 2 prises par jour (matin et soir) pour une dose de 800 mg/j.
- Dosages disponibles : Comprimés à 100 mg et 400 mg.
- Modalités de prise : L'imatinib doit être avalé entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau au cours d'un repas pour diminuer les risques d'irritation gastro-intestinales, de préférence à la même heure. En cas de difficultés à avaler, l'imatinib peut être dissous dans un verre d'eau minérale ou de jus de pomme.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en hématologie, oncologie, médecine interne et gastro-entérologie
 - Dispensation dans les pharmacies de ville

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les comprimés.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante. Noter l'incident.

Alertes

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- Tous les patients doivent faire l'objet d'un dépistage d'une infection par le virus de l'hépatite B avant l'initiation du traitement (risque de réactivation) et d'une surveillance étroite pendant et après l'arrêt du médicament.
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP 3A4](#)
- La prescription d'AVK est contre-indiquée avec la prise de ce médicament. Voir avec l'hématologue référent pour toute prise en charge d'anticoagulants.

Gestion des principaux effets indésirables

Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.

Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Très fréquents		
Diarrhée	- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Eviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement anti-diarrhéique
Nausées, vomissements	- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Eviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement antiémétique.
Eruption cutanée	Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains. Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émollissante.	Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement
Prise ou perte de poids, œdème	Surveillance de l'apparition de l'œdème	En cas de prise de poids rapide et inattendue, mise en place d'un traitement symptomatique (diurétiques)
Toxicité neurologique (fatigue ou faiblesse, céphalées, vertiges...)	Conserver une activité physique modérée (marche 30 min) est recommandée.	Prudence en cas de conduite de véhicule.
Neutropénie Fièvre, frisson	NFP devant signes évocateurs. Hygiène générale. Surveillance des signes évocateurs d'infection.	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > à 38,5°C qui décidera de la conduite à tenir.

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament