

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PROFESSIONNELS DE SANTE** »

Vinorelbine NAVELBINE®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- La vinorelbine est un médicament cytotoxique, inhibiteur de la polymérisation de la tubuline.
- Indications 2016 :
 - ✓ Cancer bronchique non à petites cellules.
 - ✓ Cancer du sein métastatique
- Posologie usuelle : 60 à 80 mg/m² par semaine en une prise. Ne pas dépasser 160 mg par semaine en association.
- Dosages disponibles : Capsules molles à 20 mg et 30 mg.
- Modalités de prise : La capsule de vinorelbine doit être avalée entière (ni mâchée, ni sucée) avec un verre d'eau à la fin d'un repas, de préférence le même jour.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
 - Dispensation dans les pharmacies de ville (Conservation entre +2°C et +8°C - prévoir un sac isotherme pour le transport-).

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker les capsules dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Noter l'incident.

Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- **Si le patient suce ou mâche la capsule par erreur (avec contact direct), lui faire rincer la bouche avec de l'eau ou mieux du NaCl 0.9%.**
- Interactions médicamenteuses :
 - o Interaction avec les anticoagulants oraux : surveillance de l'INR.
 - o Phénytoïne, itraconazole : association déconseillée.

Gestion des principaux effets indésirables

- **Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.**
- **Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.**

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Neutropénie, thrombopénie, anémie	Hygiène générale. NFP hebdomadaire. Nadir à J10, réversibilité à J14/J21 Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.
Diarrhée	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques
Nausées / vomissements	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.
Constipation	Maintien d'une bonne hydratation, alimentation riche en fibre et activité physique régulière.	Traitement par laxatifs si besoin
Alopécie	Evènement rare et perte des cheveux incomplète	
Troubles neurologiques	Examen régulier	Réversibles à l'arrêt du traitement
Autres effets indésirables rares : rash cutané, arthralgies, atteinte cardiaque, bronchospasme		

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament