

OMEDIT RHONE-ALPES
GROUPE DE TRAVAIL REFERENTIELS COMMUNS DE PROTOCOLES DE CHIMIOTHERAPIE
REFERENTIEL DE BON USAGE - CANCERS GYNECOLOGIQUES

Pré-requis :

- Seuls les protocoles de chimiothérapie validés par la littérature sont référencés.
- Toute prescription hors AMM d'un protocole de chimiothérapie comportant des médicaments « in GHS » doit faire l'objet d'une justification dans le dossier médical du patient.
 Il est possible de s'appuyer sur un référentiel régional de prise en charge du Réseau Espace Santé-Cancer pour justifier une prescription, dans la mesure où celui-ci mentionne ladite situation clinique. Le référentiel régional doit être déclaré en RCP et le compte-rendu de la RCP, tracé dans le dossier médical du patient.

Périmètre du référentiel :

- Tumeurs épithéliales gynécologiques, à l'exclusion des cancers de la vulve et du vagin.
- Tous types de traitements, à l'exception de ceux administrés par voie intrapéritonéale et de l'hormonothérapie.

CANCERS DE L'OVAIRE

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<u>A - I</u>	<u>B - Annexe INCa</u>	<u>C - III</u>
<ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - CARBOPLATINE - PACLITAXEL Poursuite du Bévacicumab en monothérapie jusqu'à progression ou toxicité inacceptable ou jusqu'au 15 mois maximum <i>Avancé (stades FIGO IIIB, IIIC et IV), 1^{ère} ligne</i> - BEVACIZUMAB - CARBOPLATINE - GEMCITABINE Poursuite du Bévacicumab en monothérapie jusqu'à progression <i>1^{ère} récurrence, patientes non pré-traitées par Bévacicumab ou d'autres anti-VEGF Patientes sensibles au platine</i> - CARBOPLATINE - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE <i>En récurrence, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes sensibles ou partiellement sensibles au platine</i> - TRABECTEDINE - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE <i>En récurrence, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes sensibles ou partiellement sensibles au platine</i> - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE en monothérapie <i>En récurrence, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes résistantes ou partiellement sensibles au platine, ne pouvant pas recevoir d'association</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - CYCLOPHOSPHAMIDE per os (chimiothérapie métronomique) $\geq 2^{ème}$ ligne 	<ul style="list-style-type: none"> - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE - TAXANES
<u>A - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u>	<u>B - Absent RBU</u>	<u>C - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u>
<ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <ul style="list-style-type: none"> • Néoadjuvant, stades III et IV (Hors AMM) • 1^{ère} ligne (Hors AMM) • Schéma 21 jours uniquement : En récurrence, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes sensibles au platine 	<ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE 1^{ère} ligne - TRABECTEDINE en monothérapie <i>En récurrence, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes résistantes ou partiellement sensibles au platine, ne pouvant pas recevoir d'association</i> 	<p>Pas de protocole</p>

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL Sujet âgé (Hors AMM) <i>1^{ère} ligne</i> - CISPLATINE - PACLITAXEL <i>1^{ère} ligne, si contre-indication au Carboplatine</i> - CARBOPLATINE - DOCETAXEL <ul style="list-style-type: none"> • Schéma 21 jours uniquement : 1^{ère} ligne, si contre-indication au Paclitaxel (Hors AMM) • En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine, si contre-indication au Paclitaxel Patientes sensibles au platine (Hors AMM) - CARBOPLATINE en monothérapie <i>Réservé aux patientes ne pouvant pas recevoir d'association</i> - PACLITAXEL en monothérapie <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes résistantes ou partiellement sensibles au platine, ne pouvant pas recevoir d'association</i> - CARBOPLATINE - GEMCITABINE <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes sensibles ou partiellement sensibles au platine</i> - TOPOTECAN IV en monothérapie <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ou de plusieurs lignes de chimiothérapie Patientes résistantes ou partiellement sensibles au platine, ne pouvant pas recevoir d'association</i> - GEMCITABINE en monothérapie (Hors AMM) <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine Patientes résistantes ou partiellement sensibles au platine, ne pouvant pas recevoir d'association</i> - GEMOX (Hors AMM) <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine</i> - GEMCITABINE - CISPLATINE (Hors AMM) <i>En récidive, après échec d'une 1^{ère} ligne de chimiothérapie à base de platine, si contre-indication au Carboplatine Patientes sensibles au platine</i> - CARBOPLATINE - CYCLOPHOSPHAMIDE IV <i>1^{ère} ligne Patientes ne pouvant pas recevoir de taxanes</i> 		
<p style="text-align: center;"><u>A - II</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de protocole</p>		

CANCERS DE L'ENDOMETRE

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p align="center"><u>A - I</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Annexe INCa</u></p> <p>- CARBOPLATINE - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE <i>Métastatique, en rechute</i></p>	<p align="center"><u>C - III</u></p> <p>- DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE - TAXANES</p>
<p><u>A - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOXORUBICINE - CISPLATINE <ul style="list-style-type: none"> • Adjuvant (Hors AMM) • Métastatique 1^{ère} ligne (Hors AMM) - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <ul style="list-style-type: none"> • Adjuvant (Hors AMM) • Métastatique 1^{ère} ligne (Hors AMM) - TAP (Hors AMM) <i>Métastatique 1^{ère} ligne</i> <i>Patientes non pré-traitées</i> (Attention à la toxicité du protocole) - CAP (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute</i> - PACLITAXEL en monothérapie (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute</i> - GEMCITABINE en monothérapie (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute</i> - DOXORUBICINE en monothérapie (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute</i> - CARBOPLATINE en monothérapie (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute</i> - CISPLATINE - PACLITAXEL (Hors AMM) <i>Métastatique, en rechute, si contre-indication au Carboplatine</i> 	<p align="center"><u>B - Absent RBU</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
<p align="center"><u>A - II</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>		

CANCERS DU COL DE L'UTERUS

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p align="center"><u>A - I</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Annexe INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE - TAXANES - CETUXIMAB - CISPLATINE - TOPOTECAN <p align="center"><i>Avancé ou en rechute</i></p>
<p><u>A - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE + RT <i>Localement avancé</i> - CARBOPLATINE + RT (<u>Hors AMM</u>) <i>Localement avancé, si contre-indication au Cisplatine</i> - CISPLATINE - 5 FU + RT (<u>Hors AMM</u>) <i>Localement avancé</i> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL (<u>Hors AMM</u>) <i>En rechute</i> - CISPLATINE - PACLITAXEL (<u>Hors AMM</u>) <i>En rechute</i> - CISPLATINE en monothérapie <i>En rechute</i> - TIP (<u>Hors AMM</u>) <i>Avancé</i> - TEP (<u>Hors AMM</u>) <i>Avancé</i> - TOPOTECAN IV - CISPLATINE <i>En rechute, après RT ou stade IV B</i> 	<p align="center"><u>B - Absent RBU</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - Médicaments non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
<p align="center"><u>A - II</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>		