

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Abiratérone acétate ZYTIGA®

Notes personnelles



Présentation et conditions de prescription

- Flacons de 120 comprimés à 250 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament :

- L'abiratérone se prend en une prise par jour avec un grand verre d'eau en dehors des repas : au moins 2 heures après un repas et 1 heure avant toute prise alimentaire.
- Le traitement se prend en continu tous les jours

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Ne pas écraser, mâcher les comprimés.
- Laisser le comprimé dans son emballage jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants. En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante. Noter l'incident
- En cas d'apparition d'effets secondaires gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



Alertes

- o Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

▸ Très fréquents

**Essoufflement,
Prise de poids rapide,
Gonflement des pieds et/ou
des jambes,
Rythme cardiaque rapide ou
irrégulier
Tension artérielle élevée,**

Bien prendre votre prednisone (ou prednisolone) prescrite.

Contactez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes.

Infection urinaire

Ayez une bonne hygiène de vie. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)

Alertez votre médecin en cas de symptôme.

▸ Fréquents

Troubles du foie

Contactez votre médecin en cas d'apparition de symptômes.

Elévation de votre glycémie

Contactez votre médecin en cas d'apparition de résultat élevé.

Risque de fractures osseuses

Ne pas vous mettre dans des situations à risque

Contactez votre médecin en cas d'apparition de problème.