

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PATIENT** »

Bosutinib BOSULIF®



Notes personnelles

Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 28 comprimés dosés à 500 mg ou à 100 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier.
- Il est disponible exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

Comment prendre ce médicament

- Le bosutinib se prend avec un verre d'eau. Il est pris pendant ou en dehors des repas.
- Pour le moment de prise : choisir un moment dans la journée qui vous permettra de ne pas oublier la prise du médicament.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laisser les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation de comprimé.
- Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Noter l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez-vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.



Alertes

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus) au cours du traitement

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

► Fréquents

Diarrhée

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l'alcool.
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour.
Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

Nausées/Vomissements

Essayer de boire souvent, par petites quantités
Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.

Prendre les antiémétiques prescrits.
Appeler votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.

Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin

Un bilan sanguin doit être réalisé périodiquement. Les résultats doivent être communiqués à votre médecin.

En présence de signes infectieux (température > 38°C, frissons, toux, brûlures urinaires), contacter le médecin.

Fièvre, frisson

Reposez vous souvent.
Limiter les contacts avec les personnes malades.
Lavez-vous les mains fréquemment.
Désinfecter vos plaies.

Démangeaisons, éruption cutanée, assèchement

Eviter l'exposition au soleil.
Utiliser un savon doux. Appliquez souvent une crème hydratante.

Contactez votre médecin si besoin

Céphalées ou myalgies

Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1 g par prise, maximum 4 fois/jour). - Contacter votre médecin si les symptômes persistent

Toux, dyspnée, difficultés à respirer

Contactez votre médecin.

Prise de poids, œdème dans les jambes

Surveiller votre poids.
Limiter l'apport de sel.

Contactez votre médecin en cas de modification de votre poids (plus ou moins 2 kg dans le mois).

Saignements

Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine

Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (nez, urine, ...)