

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Capécitabine
XELODA® & Génériques



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- La capécitabine est un médicament cytotoxique antimétabolite
- Indications 2016 :
 - ✓ Cancer colorectal de stade III en traitement adjuvant et en situation métastatique.
 - ✓ Cancer gastrique avancé, en 1^{ère} ligne, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine.
 - ✓ Cancer du sein localement avancé ou métastatique :
 - en monothérapie après échec aux taxanes et aux anthracyclines ou lorsqu'une anthracycline est contre indiquée.
 - en association au docétaxel, après échec aux anthracyclines.
- Posologies usuelles :
 - Cancer du sein : 1250 mg/m² deux fois par jour à intervalles d'environ 12h pendant 14 jours tous les 21 jours en monothérapie ou en association.
 - Cancer colorectal :
 - en monothérapie : 1250 mg/m² deux fois par jour à intervalles d'environ 12h pendant 14 jours tous les 21 jours
 - en association : 800 à 1000mg/ m² deux fois par jour à intervalles d'environ 12h pendant 14 jours tous les 21 jours
 - Cancer gastrique : 625mg/m² deux fois par jour à intervalles d'environ 12h en continu.
- Dosages disponibles : Comprimés à 150 mg et 500 mg (Princeps et génériques)
- Modalités de prise : La capécitabine doit être avalée en entier (ni écrasée, ni mâchée) avec un verre d'eau, dans les 30 minutes après un repas, de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
 - Dispensation exclusivement dans les pharmacies de ville.

Conseils généraux



- Ne pas déconditionner, ni stocker les comprimés dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Noter l'incident.

Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- Interactions médicamenteuses :
 - Augmentation des taux plasmatiques de warfarine et dérivés, phénytoïne.

Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

Fréquents

Syndrome main-pied Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds

Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains.
Eviter de porter des bijoux, des chaussures trop serrées, utiliser un savon doux.
Appliquer souvent une crème hydratante et/ou émolliente sur les pieds et les mains.

Si syndrome main-pied de grade >2 (érythème douloureux, et œdème et/ou gêne dans les activités quotidiennes), alerter le médecin qui décidera ou non de la modification du traitement.

Diarrhée

Eviter les aliments épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l'alcool.
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)

Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques

Nausées / vomissements

Eviter les aliments épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l'alcool.
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)

Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.

Ulcération de la bouche

Rappel au patient d'avoir une bonne hygiène buccale, utilisation d'une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas et qu'il évite les aliments acides, épicés et irritants.

Prescription de bains de bouche au bicarbonate, sans alcool.

Troubles du bilan hépatique

Surveillance des transaminases et de la bilirubine.

Alerter le médecin si nécessaire.

Moins fréquents

Neutropénie, thrombopénie, anémie

Hygiène générale.
NFP mensuelle.
Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements

Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.

Toxicité neurologique Fatigue, céphalées

Conservé une activité physique modérée (marche 30 min) est recommandée.

Prudence en cas de conduite de véhicule.

Peu fréquents

Douleur thoracique

Syndrome Stevens-Johnson

Arrêt immédiat du traitement

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament