

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes
Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

**FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »**

Céritinib ZYKADIA®

Notes personnelles



Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le céritinib est une thérapie ciblée, inhibiteur de la tyrosine kinase spécifique de la protéine ALK.
- Indications 2015 :
 - o Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé ou métastatique chez des patients prétraités par crizotinib présentant un réarrangement du gène ALK, ne pouvant pas être inclus dans un essai clinique en cours avec le céritinib et pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique appropriée.
- Posologie usuelle : 750 mg par jour en une prise.
- Dosage disponible : Gélules à 150 mg.
- Modalités de prise : Le céritinib doit être avalé entier (ni mâché, ni écrasé) avec un verre d'eau, en dehors des repas (au moins 2h avant ou 2h après un repas), de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - o Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie.
 - o Dispensation exclusivement dans les pharmacies hospitalières. (*dispositif « AMM post ATU » dans l'attente d'une décision relative au remboursement*)

Conseils généraux



- Ne pas déconditionner, ni stocker les gélules dans un pilulier.
- Ne pas ouvrir, écraser ou mâcher les gélules.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante sans augmenter celle-ci.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, avertir le médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter le traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.

Alertes

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt.
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP3A4](#)
- Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs de la P-gP

Gestion des principaux effets indésirables

- **Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.**
- **Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.**

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
› Fréquents		
Neutropénie Fièvre, frisson Thrombopénie Anémie	- Hygiène générale. - NFP avant chaque cure. - Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements	- Alerter le médecin oncologue référent en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.
Toxicité hépatique	Surveillance des transaminases et de la bilirubine	Alerter le médecin oncologue référent si nécessaire.
Diarrhée	- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Eviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement anti-diarrhéique
Dyspnée, toux	- Bilan pulmonaire - Surveillance renforcée en cas d'infections respiratoires, irradiation, chimiothérapie.	- En cas de majoration rechercher pneumopathie interstitielle et contacter le médecin oncologue référent.
Nausées, vomissements	- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Eviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	réévaluer le Traitement antiémétique.

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament