

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Palbociclib IBRANCE®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le palbociclib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosine kinase CDK4/6.
 - Indications 2017 : cancer du sein avancé ou métastatique positif aux récepteurs hormonaux sans surexpression des récepteurs HER2 :
 - ✓ En association à un inhibiteur de l'aromatase
 - ✓ En association au fulvestrant chez les femmes ayant été traitées antérieurement par hormonothérapie
- Chez les femmes en pré/périménopause, un traitement par agoniste LH/RH doit être associé.
- Posologie usuelle : 125mg par jour pendant 21 jours, tous les 28 jours
 - Dosage disponible : Gélules à 75 mg, 100 mg ou 125 mg.
 - Modalités de prise : Le palbociclib doit être avalé en entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau au cours d'un repas de préférence à la même heure.
 - Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
 - Dispensation exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker les gélules dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Noter l'incident.



Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 3 semaines chez les femmes et 14 semaines chez les hommes après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP 3A4](#)
- L'absorption de substances augmentant le pH gastrique (IPP, antiH2) peut diminuer l'absorption du médicament. Si besoin, recours à des antiacides d'action rapide à décaler de la prise du palbociclib.

Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
› Fréquents		
Neutropénie, thrombopénie, anémie	Hygiène générale. Au cours des deux premiers cycles : NFP à J1, J14 et J21 ; Cycles suivants : NFP à J1 Si absence de neutropénie au cours des 6 premiers cycles : NFP tous les 3 mois	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38°5C qui décidera de la conduite à tenir. Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements
Alopécie	Possible, partielle	
Diarrhée	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques
Nausées / vomissements	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.
Stomatite	Rappel au patient d'avoir une bonne hygiène buccale, utilisation d'une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas et qu'il évite les aliments acides, épicés et irritants.	Prescription de bains de bouche au bicarbonate, sans alcool.
Fatigue	Conservé une activité physique modérée	Prudence en cas de conduite de véhicule.
Eruption cutanée	Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains. Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émolliente.	Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament