

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Sorafénib NEXAVAR®



Notes personnelles

## Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le sorafenib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosine kinase.
- Indications 2016 :
  - ✓ Carcinome rénal avancé en cas d'échec ou de contre-indication à un autre traitement.
  - ✓ Carcinome hépato cellulaire.
  - ✓ Carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire à l'iode radioactif.
- Posologie usuelle : 400 mg deux fois par jour à intervalles d'environ 12 h
- Dosages disponibles : comprimés à 200 mg
- Modalités de prise : Le sorafenib doit être avalé entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau ou dissous dans de l'eau, en dehors du repas ou avec un repas pauvre en graisse de préférence à la même heure. En cas de repas riche en graisses, prendre le médicament au moins 1 h avant, ou 2 h après.
- Conditions de prescription et de délivrance :
  - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
  - Dispensation dans les pharmacies de ville.

## Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker les comprimés dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante sans augmenter la dose. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante. Noter l'incident.



## Alertes

- Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP 3A4](#)

## Gestion des principaux effets indésirables

- **Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.**
- **Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.**

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
› <b>Fréquents</b>		
<b>Diarrhée</b>	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques
<b>Nausées / vomissements</b>	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.
<b>Cutanés : Rash, érythème, prurit, sécheresse cutanée syndrome main-pied.</b>	Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains. Eviter de porter des bijoux, des chaussures trop serrées, utiliser un savon doux. Appliquer souvent une crème hydratante et/ou émolliente sur les pieds et les mains.	Si syndrome main-pied de grade >2 (érythème douloureux, et œdème et/ou gène dans les activités quotidiennes), alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement.
<b>Alopécie possible</b>		
<b>Neutropénie, anémie, thrombopénie</b>	NFP devant signes évocateurs. Hygiène générale. Surveillance des signes évocateurs d'infection.	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > à 38,5°C qui décidera de la conduite à tenir.
<b>Cardiovasculaire : Hypertension artérielle</b>	Hypertension artérielle	Surveillance de la tension artérielle une fois par semaine, voire plus fréquente si augmentation.
<b>Céphalées Arthralgies, myalgies</b>		
› <b>Peu fréquents</b>		
<b>Flush Hémorragie</b>		

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament